

Mieux connaître le médicament ambrisentan (Volibris)

Hypertension artérielle pulmonaire



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

Ce feuillet vous donne des informations sur votre médicament, l'ambrisentan (Volibris).

Pourquoi m'a-t-on prescrit ce médicament?

Ce médicament vous est prescrit car vous souffrez d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). L'HTAP signifie que la pression est élevée dans les vaisseaux sanguins situés entre votre cœur et vos poumons. Ce médicament peut diminuer vos symptômes et améliorer votre capacité à faire de l'exercice. Il peut aussi ralentir la progression de la maladie.

Comment ce médicament agit-il?

L'ambrisentan permet le relâchement ou la dilatation de vos artères pulmonaires. Cette dilatation diminue la pression pulmonaire. Ainsi, votre cœur peut pomper plus efficacement le sang vers vos poumons.

Comment dois-je prendre ce médicament?

Vous devez prendre le médicament :

- Une fois par jour, régulièrement (ou tel que prescrit par votre médecin)
- Avec ou sans nourriture

Vous ne devez pas couper, écraser ou croquer le comprimé.

Ne cessez jamais votre médication sans l'avis de votre médecin, pharmacien ou infirmière clinicienne (équipe traitante). L'arrêt soudain de votre médicament peut aggraver vos symptômes.

Puis-je prendre d'autres médicaments ou des produits de santé naturels avec ce médicament?

Demandez toujours à votre pharmacien avant de consommer des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels. Ces produits peuvent ne pas vous convenir. Ils peuvent interagir avec votre médicament.

Quels sont les effets secondaires?

Ce médicament peut occasionner un mauvais fonctionnement du foie ou une diminution des globules rouges (anémie). Vous devez effectuer des **prises de sang régulièrement** afin de surveiller ces effets secondaires.

Autres effets secondaires possibles qui ne nécessitent pas une consultation médicale immédiate :

- Maux de tête
- Congestion nasale, symptômes ressemblant à un rhume ou à une sinusite
- Bouffées de chaleur
- Enflure des jambes et des chevilles (rétention d'eau)
- Problèmes digestifs, tels que maux de cœur (nausées), brûlement d'estomac, constipation





Quels symptômes dois-je surveiller?

Vous devez communiquer rapidement avec votre équipe traitante si vous présentez :

- Une prise de poids de plus de 5 livres (2 kg) sans raison apparente
- Une augmentation de l'enflure au niveau des jambes ou de l'abdomen
- Une augmentation de votre essoufflement ou de la fatigue
- Un cœur qui bat vite ou de façon irrégulière (palpitations cardiaques)
- Des symptômes qui peuvent indiquer un **mauvais fonctionnement du foie** :
 - Un jaunissement de la peau ou des yeux
 - Des maux de cœur constants (nausées)
 - Des vomissements
 - De la fièvre avec une température de plus de 38°C (100.4°F)
 - Des douleurs abdominales
 - Une fatigue inhabituelle
- Des symptômes qui peuvent indiquer une **anémie** :
 - De la pâleur
 - Des étourdissements
 - Une augmentation de l'essoufflement
 - Une fatigue inhabituelle

Présentez-vous à l'**urgence** si vous éprouvez des symptômes sévères ou si votre condition se détériore en dehors des heures d'ouverture de la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire.

Que faire si j'oublie une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, prenez-la dès que possible. Prenez la dose suivante au moment habituel. Par contre, s'il est presque l'heure de votre dose suivante, laissez tomber la dose oubliée. Ne doublez jamais une dose pour compenser celle que vous avez oubliée. Dans le doute, contactez votre pharmacien. Il vous indiquera la conduite à suivre.

Quoi faire si je planifie une grossesse, si je suis enceinte ou si j'allaité?

Vous devez éviter une grossesse si vous souffrez d'HTAP. Les risques de mortalité pour vous et votre bébé sont importants.

Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, assurez-vous d'utiliser une méthode de contraception fiable pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après la prise de la dernière dose du médicament. Informez-vous auprès de votre équipe traitante sur la meilleure méthode contraceptive pour vous.

Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou si vous allaitez. Parlez-en à votre équipe traitante.

À qui m'adresser pour obtenir de l'aide ou poser des questions?

Contactez la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire :

418 656-8711 poste 1325

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00

N'hésitez pas à laisser un message.



Ressources utiles

IUCPQ-ULaval

bibliotheque-patients.iucpq.qc.ca

Vous pouvez consulter les documents d'enseignement produits par l'IUCPQ-ULaval directement sur notre site web.



Le document suivant pourrait vous intéresser :

- Apprivoiser votre hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

Inscrire dans le champ de recherche le titre du document que vous désirez consulter.

Références

Briggs, G. G., Freeman, R. K., Tower, C. V., Forinash, A. B. (2021). *Briggs drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risks* (12^e éd.). Wolters Kluwer.

GSK. (2021, 2 juillet). *Product monograph including patient medication information: ^{Pr}Volibris ambrisentan tablets 5 mg and 10 mg endothelin receptor antagonist*. ca.gsk.com/media/6563/volibris.pdf

IBM Watson Health. *Micromedex*[®] (version électronique). micromedexsolutions-com.acces.bibl.ulaval.ca/

Le contenu de ce document ne remplace d'aucune façon les recommandations faites, les diagnostics posés ou les traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Ce document est protégé sous la licence Creative Commons

