

INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par les départements de pharmacie
et d'inhalothérapie à l'intention des usagers*

DORNASE ALPHA (Pulmozyme^{md})

POSOLOGIE : 2,5 mg (1 nébule de 2,5 ml) en nébulisation

- 1 fois par jour 2 fois par jour matin et soir

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est utilisé pour rendre les sécrétions pulmonaires plus fluides, donc plus faciles à déloger.
- Il est utilisé en association avec d'autres traitements dans le but de diminuer la fréquence des infections respiratoires et d'améliorer la fonction pulmonaire des usagers atteints de fibrose kystique.

2. CONSEILS :

- L'administration de ce médicament est souvent précédée d'une dose de bronchodilatateur (Ventolin^{md}, Bricanyl^{md} ou autre). Toutefois, ce n'est pas nécessaire chez tous les usagers.
- Vérifiez la date d'expiration sur la nébule et assurez-vous que la solution est claire et sans particules.
- Une séance de physiothérapie respiratoire est recommandée après l'administration de Pulmozyme^{md}.

Administration

- Retirez le capuchon de la nébule et vider son contenu (2,5 ml) dans le nébuliseur. Il n'y a rien d'autre à ajouter dans le nébuliseur.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Il faut toujours utiliser le même nébuliseur (ex : Pari LC +) à chaque traitement. Ce nébuliseur doit être réservé à l'**usage exclusif** du Pulmozyme^{md}.
- Il **ne faut pas mélanger** le Pulmozyme^{md} avec un autre médicament.
- Pulmozyme^{md} se conserve au **réfrigérateur** et à l'abri de la lumière.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Ce médicament est **généralement bien toléré**.
- Ces effets pourraient survenir en début de traitement :
 - Changement de la voix
 - Inconfort au niveau de la gorge
 - Toux
 - Légère douleur au thorax
 - Yeux rouges
- Très rarement :
 - Rougeur de la peau
 - Étourdissements
 - Fièvre
 - Écoulements nasaux

Ces effets secondaires sont habituellement **légers et disparaissent souvent après quelques jours** de traitement.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une aggravation de votre condition
- Une persistance d'un effet secondaire incommodant.