

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Une surveillance de vos enzymes hépatiques et de votre formule sanguine (hémoglobine) requiert des prises de sang de contrôle à tous les mois durant la première année de traitement ou selon les directives de votre médecin.
- Éviter ce médicament si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au macitentan ou à un de ses composants.
- Éviter ce médicament si vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou allaitez.
- Ne pas écraser ou couper les comprimés.
- Conserver le médicament entre 15 et 30°C et hors de la portée des enfants.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

Généralement de faible intensité, les effets indésirables possibles incluent :

- Maux de tête (l'acétaminophène/Tylenol^{md} peut vous soulager)
- Anémie
- Enflure aux jambes (respecter la restriction en sel)
- Un risque augmenté d'infections respiratoires
- Un risque augmenté d'infections urinaires.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Que l'intensité des effets indésirables mentionnés ci-dessus est trop sévère et nuit à vos activités quotidiennes.
- Une prise de poids de plus de 5 livres (2 kg), une augmentation de l'enflure au niveau des jambes ou de l'abdomen.
- Une augmentation de votre essoufflement ou de la fatigue.
- La présence de nausée, vomissements, douleur abdominale et de coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux.
- Des signes ou symptômes d'une éventuelle grossesse.
- Des signes de réaction allergique au macitentan (enflure au visage ou à la gorge, douleurs ou serrement thoracique).