

# INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département  
de pharmacie à l'intention des usagers*

## TRÉPROSTINIL (Remodulin<sup>md</sup>)

**POSOLOGIE :** \_\_\_\_\_

### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (pression élevée dans les vaisseaux sanguins situés entre le cœur et les poumons). Il diminue la pression pulmonaire anormalement élevée en permettant une relaxation de ces vaisseaux. Il diminue aussi la formation de caillots.

### 2. ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT :

- Le Remodulin<sup>md</sup> se donne en perfusion continue par voie sous-cutanée. Le médicament est administré par un cathéter inséré sous la peau de l'abdomen ou des hanches.
- Le cathéter est relié à une pompe de la dimension d'une pagette. Cette pompe contient le médicament et contrôle le débit auquel il est administré. Vous devez la porter sur vous en permanence.
- La pompe ne doit pas être arrêtée sur une longue période. L'arrêt peut provoquer rapidement une réapparition des symptômes, c'est-à-dire une reprise de l'hypertension artérielle pulmonaire qui pourrait être grave.

### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Ce médicament pourrait vous rendre plus à risque de saignements. Soyez prudent lors de la manipulation d'objets coupants ou lors de manœuvres dangereuses.
- Demandez toujours à votre pharmacien(ne) ou à votre médecin avant d'acheter des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels. Ces produits pourraient ne pas vous convenir ou présenter une interaction avec votre médicament.

### 4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Douleur et démangeaisons au site d'injection
- Maux de tête, somnolence
- Étourdissements dus à une baisse rapide de la tension artérielle
- Nausées
- Diarrhées
- Bouffées de chaleur
- Douleur à la mâchoire

### 5. CONSULTER VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Des selles noires ou rougeâtre.
- Une fatigue inhabituelle, de la pâleur, des étourdissements et de l'essoufflement.
- De la toux accompagnée de crachats de sang
- Une aggravation soudaine de votre condition pulmonaire (ex : essoufflement, râles, etc.)
- De l'inflammation, de la rougeur, de la chaleur et de la douleur au site d'injection.